



Donovanose

01 Comprendre

La donovanose est une infection rare due à *Klebsiella granulomatis*. Elle peut provoquer une ulcération génitale qui augmente lentement, souvent peu douloureuse et saignant facilement. L'histoire de voyages et d'expositions aide le diagnostic.

02 Comment faire le bilan ?

L'examen et parfois un prélèvement tissulaire sont nécessaires. Une ulcération chronique peut également avoir une cause inflammatoire ou tumorale ; son aspect ne suffit pas à identifier l'infection.

03 Que peut-on faire ?

Le médecin prescrit un antibiotique adapté avec suivi jusqu'à cicatrisation. Ne vous contentez pas d'un traitement bref emprunté à quelqu'un. Les partenaires et les autres risques d'IST sont évalués.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Lésion qui s'étend, saigne, ne cicatrise pas ou s'accompagne de fièvre : consultation rapide. Une baisse de douleur ne prouve pas la guérison.

QUESTIONS À POSER

Demandez : comment confirmer le diagnostic ? Quelle durée de traitement et quel contrôle après cicatrisation ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

CDC · Donovanose



الدونوفانوز: الورم الحبيبي الأربي

01 لنفهم الحالة

الدونوفانوز عدوى نادرة تسببها *Klebsiella granulomatis*. قد تحدث قرحة تناسلية تكبر ببطء، غالبًا قليلة الألم وسهلة النزف. يفيد ذكر السفر والتعرضات.

02 كيف نقيّم الحالة؟

يلزم الفحص وأحيانًا عينة نسيجية. قد تكون القرحة المزمنة النهائية أو ورمية؛ فلا يكفي المظهر لتحديد العدوى.

03 ما الذي يمكن فعله؟

يُوصف مضاد مناسب مع متابعة حتى الالتئام. لا تكتفوا بعلاج قصير من شخص آخر. يُقيّم الشركاء وبقية مخاطر العدوى الجنسية.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

آفة ممتدة أو نازفة أو لا تلتئم أو مصحوبة بحمى تحتاج استشارة سريعة. نقص الألم لا يثبت الشفاء.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: كيف نؤكد التشخيص؟ ما مدة العلاج والمراقبة بعد الالتئام؟